



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Enfermería

Enfermería UdeA Te cuida

¿ Cuáles síntomas me indican que
debo consultar a urgencias?



- Repentinamente tiene dificultad para hablar, comer o caminar.
- Se desmayó, siente mareo y pierde el equilibrio.
- No recuerda las cosas, lugares o personas.





- Se siente confundido.
 - No sabe dónde está ni qué fecha es.
- Ve borroso, pierde la visión
- o ve cocuyos, tiene dolor intenso en los ojos, no oye.
- Convulsiona.

- Pierde la fuerza, la movilidad o la sensibilidad de alguna parte del cuerpo.
- Tiene dificultad para caminar o pronunciar las palabras y habla enredado.
- Observa o siente la boca torcida.



- Si la persona tiene pánico y no parece escuchar porque está en su mundo,
- Siente que lo persiguen o ve alucinaciones.

- No quiere hablar, comer, organizarse ni salir de su cama en unos días porque está muy triste




- Se desconecta del entorno,
- Dice escuchar o ver cosas que no están, está muy tensa,
- Tiene los puños cerrados y se muestra más irritable con los demás.
- No tiene deseos de vivir
Expresa deseos de morir.





- Se ocasionó heridas que presentan un sangrado que no se detiene o son producidas por arma blanca o armas de fuego.


- Presenta una quemadura que compromete todas las extremidades superiores (brazos) o inferiores (piernas), rostro o todo el torso.





- Presenta una reacción alérgica luego de ingerir un medicamento o alimento que produce hinchazón de la cara, los labios, los ojos y en la garganta con carraspeo y dificultad para tragar.
- Problemas para respirar, con silbido del pecho

- Un objeto extraño o líquido cae en ojo, oído, nariz, recto, vagina, estómago o piel, y causa dolor intenso.





- Consumió pastillas sin prescripción médica, líquidos o sustancia tóxicas que no se deben tomar.

- Presenta una herida que lleva varios días y en vez de cicatrizar duele y se observa enrojecida, caliente, con secreción de material purulento (pus).



- Si padece diabetes y al tomarse los niveles de azúcar en la sangre en casa y está por encima de 250 mg/dl a pesar de aplicarse la insulina o tomar el tratamiento oral y presenta mareo, sed y aumento en la cantidad de orina.
- Si el nivel de azúcar es menor 60 mg/dl aún si ha comido o tomado una bebida con azúcar.



- Tiene más de 5 deposiciones diarreicas al día y varios episodios de vómito, sensación de debilidad, boca seca calambres y fatiga.





- Es incapaz de orinar tiene dolor o ardor al orinar y orina de mal olor.

- Presenta dolor u opresión en el pecho que se pasa al brazo o la mandíbula que no cede a pesar de que suspenda lo que estaba haciendo y continúa estando en reposo. Además, hay mareo, debilidad, sudoración y sensación de ahogo.





- Tiene dolor en cualquier parte del cuerpo que le imposibilite la movilidad, además de sudoración, palidez, mareo, náuseas, palpitaciones o dificultad para respirar y empeora con el paso del tiempo.
- Siente dificultad para respirar o el color de la piel es morada.

- Si la temperatura no baja de 38.5°C a pesar del analgésico o si tiene más de 65 años una temperatura menor a 36°C .





- Si su familiar tiene una enfermedad que no tiene tratamiento y está en la última fase de su vida y presenta dolor que no se controla con el tratamiento que le habían prescrito, además si el dolor lo lleva a cambios de ánimo y desespero.
- Si le da miedo que muera estando ustedes dos solos. Si el paciente desea morir en el hospital.
- Si hay un síntoma nuevo que no sabe manejar.

- Cuando hay salida de sangre por cualquier orificio corporal como la nariz que no mejore con la presión o el hielo.
- Si realizar deposición con sangre y si sangra por una cavidad como como oído, uretra, vagina o ano.
- Si orina más frecuentemente y de color oscuro.

