

# Mordedura por araña violín

## Loxoscelismo

### ¿Cómo identificarlas?

Son pequeñas, su cuerpo mide entre 8 - 15 mm, sin contar las patas.

Tienen seis ojos dispuestos en parejas que forman de U.



Las arañas del género *Loxosceles* son de color café parduzco.

En el **cefalotórax**, unión de la cabeza y el tórax, tienen una figura que parece un **violín**, y es más claro que el abdomen.



### ¿Qué se siente en una mordedura?

Se pueden presentar síntomas en el lugar de la mordedura (**cutáneo**) y en algunos casos puede llegar a afectar el resto del cuerpo (**cutáneo-visceral**).

#### Cutáneo

- Es la manifestación más común.
- Al instante de la mordedura no se presenta dolor, sin embargo entre las 2 y 8 h posteriores el dolor se agudiza con tendencia a aumentar.
- Fiebre, hinchazón, inflamación y picazón.
- Entre 24–36 h se evidencia una ampolla con sangre rodeado por un halo pálido.
- A los 7 días aparece una costra, debajo de la cual hay una área ulcerada.

#### Cutáneo - visceral

- Estos síntomas inician entre 12-24 h posterior a la mordedura y se pueden presentar complicaciones, tales como:
- Alteraciones hemolíticas (en sangre): como anemia, ictericia (color amarillo en la piel) hasta coagulación, que se puede extender a todo el cuerpo.
- Sangre en la orina e insuficiencia renal que, en algunos casos, puede evolucionar a falla renal.
- Convulsiones, hipotensión y coma.

**Solo 6** de los 195 casos reportados por mordedura de araña entre el 2006 y 2010 en Colombia fueron provocados por este género.

Para más información comunicarse al Serpentario de la Universidad de Antioquia del Grupo de Investigación Programa de Ofidismo/Escorpionismo:

 (+574)2192315

serpentario@udea.edu.co

Créditos de la imagen: C.B.Taylor.



**UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA**



El conocimiento  
es de todos

Minciencias