

Relación de la sintomatología depresiva con los indicadores de salud mental: vulnerabilidad familiar y funcionamiento familiar, en adolescentes escolarizados. Municipio de Villahermosa - Tolima, 2013.

Eilyn Ly Pimienta Gómez

Estudiante de Gerencia en Sistemas de Información en Salud
Faculta Nacional de Salud Pública

Con el Apoyo de
Línea de investigación Mediciones en Salud Pública

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

2013

El estudio Nacional de Salud Mental en Colombia, mostró que la prevalencia de vida de la depresión en adolescentes fue del 7,1%

¿cuál es la potencial asociación de la sintomatología depresiva según el funcionamiento familiar y la vulnerabilidad familiar en los adolescentes de educación básica secundaria y media vocacional del municipio de villa hermosa Tolima 2013?

la familia, la escuela, los compañeros y las relaciones sociales desempeñan un papel importante en la génesis de la depresión del adolescente

La depresión afecta cada vez más a los jóvenes, y como una de sus consecuencias, cada año se suicidan más de 800 000 personas

La OMS considera la depresión como un problema de salud serio ya que es muy frecuente en todo el mundo

La vulnerabilidad en las familias se presentan en la poca vinculación afectiva, baja flexibilidad, no búsqueda de apoyo y comprensión de la familia y en buscar ayuda en personas ajenas al núcleo familia

Pregunta de investigación





UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

Objetivo General

Explorar la potencial asociación de la sintomatología depresiva según los indicadores de salud mental: funcionamiento familiar y vulnerabilidad familiar en adolescentes que cursan educación básica secundaria y media vocacional en instituciones educativas del municipio de Villahermosa – Tolima, año 2013.




Marco Teórico



Adolescente: Definida como una etapa del ciclo vital entre la niñez y la adultez, que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivas

Depresión: se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o placer en todas las actividades, este afecta profundamente a la persona y su entorno, limitando su actividad diaria



Funcionamiento familiar: es la capacidad que tiene el sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa.

Vulnerabilidad familiar: están dadas por las situaciones estresantes en un sistema familiar, estas son determinadas a la poca vinculación afectiva, baja flexibilidad, a la no búsqueda de apoyo y comprensión de la familia y en caso de necesitar ayuda se prefiere confiar en personas ajenas al núcleo familiar



metodología

Estudio

Descriptivo de corte transversal

Población

Estudiantes escolarizados entre 11 y 19 años de edad del municipio de Villahermosa - Tolima

Tamaño de muestra

544 adolescentes según Censo

Instrumentos de recolección

Nivel de depresión Children's Depression Inventory (CDI-LA)

Cohesión familiar ¿como es tu familia?

Vulnerabilidad familiar APGAR familiar

Criterios de inclusión

- Cualquier sexo
- Matriculados
- Tener autorización de sus padres
- Aceptar libremente el instrumento



1. revisión de la BD y recodificación de variables

2. caracterización según variables socio demográficas

3. la prevalencia del nivel de depresión según variables socio-demográficas

Plan de análisis

4. la prevalencia de la vulnerabilidad y el funcionamiento familiar según variables socio-demográficas

5. factores asociados a la presencia de depresión con las variables socio demográficas y con los indicadores de salud mental: vulnerabilidad familiar y funcionamiento familiar



Resultados...





Descripción Demográfica

UNIV
DE AN



Sexo
50,4%



Edad
11 a 14

62,1%



Zona
53,5%




Familia
nuclear

54%



Nivel de riesgo de sintomatología depresiva en adolescentes escolarizados

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803



El 27,4% de la población total de adolescentes presento algún nivel de sintomatología depresiva



Variables asociadas al nivel de sintomatología depresiva

Características		Algún nivel de depresión			OR (IC 95%)	Chi cuadrado	Valor p
		Si	No	Total			
Cohesión familiar	Vulnerable	35	31	66	0,28 (0,2-0,5)	24,8	0,000
	No vulnerable	114	364	478			
Participación en la solución de problemas	Vulnerable	69	119	188	0,50 (0,3-0,7)	12,5	0,000
	No vulnerable	80	276	356			
Comunicación con la madre	Vulnerable	82	125	207	0,38 (0,3-0,6)	25,1	0,000
	No vulnerable	67	270	337			
Comunicación del padre con los hijos	Vulnerable	112	239	351	0,51 (0,3-0,8)	10,2	0,001
	No vulnerable	37	156	193			



VULNERABILIDAD FAMILIAR

- PARTICIPACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS
- COMUNICACIÓN CON LA MADRE
- COMUNICACIÓN CON EL PADRE
- BUSQUEDA DE APOYO RELIGIOSO
- REDEFINICION DE PROBLEMAS
- FUENTES DE APOYO DEL ADOLESCENTE
- RUTINAS FAMILIARES
- SATISFACCION CON LA VIDA
- IMPORTANCIA DEL ESFUERZO PERSONAL
- RENDIMIENTO ACADEMICO
- ACUMULACION DE TENCIONES
- SINTOMAS Y PROBLEMAS

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR



TIPOLOGIA FAMILIAR
ZONA DEL MUNICIPIO



Variables asociadas al nivel
de sintomatología depresiva
 $p \leq 0,25$

Modelo Multivariado

Factores	B	E.T.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)	I.C. 95% para EXP(B)	
							Inferior	Superior
Rutinas_familiares	,795	,322	6,107	1	,013	2,214	1,179	4,159
Satisfaccion_vida	1,147	,318	13,048	1	,000	3,150	1,690	5,871
Esfuerzo_personal	2,112	,631	11,205	1	,001	8,262	2,399	28,451
Constante	-4,209	1,045	16,216	1	,000	,015		

Prueba de bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow: Chi cuadrado= 7,842 (p=0,449); R cuadrado de Nagelkerke= 0,395

Un adolescente con vulnerabilidad en las rutinas familiares, en la satisfacción con la vida y en el esfuerzo personal, presenta riesgo en tener algún nivel de depresión en el 39,5% de los casos.

Gracias!!!

