


ASOCIACIÓN ENTRE LA REBELDÍA DEL ADOLESCENTE Y ALGUNOS INDICADORES DE SALUD MENTAL EN LA ZONA NORORIENTAL DE MEDELLÍN, 2006.

**Clara Elena Piedrahita Patiño
Ramón Eugenio Paniagua Suárez
Carlos Mauricio González Posada**

**Línea psicosocial
Grupo de investigación en salud mental**

**Universidad de Antioquia
Facultad Nacional de Salud Pública
“Héctor Abad Gómez”
Medellín
2009**



INTRODUCCIÓN

DEPRESIÓN

- La depresión es un trastorno mental, un trastorno del humor o afectivo, caracterizado por una tristeza profunda. Es una enfermedad en la cual se pierde la capacidad de interesarse y disfrutar de la vida, con una disminución de la energía o vitalidad acompañado de tristeza, inseguridad y cansancio exagerado; suelen aparecer sentimientos de culpa, acompañado de una visión muy pesimista sobre futuro.

Mexicanos DC. Depresión. [Sitio en internet] Disponible en:http://www.serviciosmedicos.pemex.com/salud/boletin/19/boletin_depresion/boletin.html. Consulta: 31 de marzo de 2009.



FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

- El funcionamiento familiar es muy importante para lograr un estado adecuado de salud en la familia y en cada uno de los miembros de ella. La familia es la meso estructura social, juega un papel importante en tanto instancia intermedia entre los factores de la sociedad en general y los individuales. La familia es el escenario donde se satisfacen las necesidades de materiales y espirituales básicas para el fomento y la conservación de la salud y de bienestar, de sus miembros.



DROGAS

- Las drogas son sustancias naturales o sintéticas, médicas o no médicas, legales o ilegales, que tienen efecto sobre las funciones psíquicas, determinan la tolerancia y dependencia y cuyo uso excesivo y/o prolongado conlleva a efectos notables perjudiciales.
- Todas ellas afectan el sistema nervioso central; preocupa mayormente las drogas más frecuentemente consumidas como el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, la marihuana, la cocaína, el éxtasis y los inhalantes porque de acuerdo a su nivel de consumo crean adicción o dependencia.

Bandera A. Toxicomanía: conceptualización. Disponible en:
<http://www.sld.cu/libros/libros/libro5/tox2.pdf>. Consulta: 31 de marzo de 2009.




REBELDÍA

- La rebeldía es la oposición deliberada a la autoridad o la tradición; generalmente la palabra rebeldía implica que hay desobediencia donde debería haber obediencia y la obediencia significa la omisión a la autoridad.

Bandera A. Toxicomanía: conceptualización. Disponible en:
<http://www.sld.cu/libros/libros/libro5/tox2.pdf>. Consulta: 31 de marzo de 2009.





METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO

- El estudio es transversal, dirigido a adolescentes escolarizados en la zona de nororiental de la ciudad de Medellín para el año 2006 y con el fin de explorar la asociación entre la depresión, el consumo de sustancias psicoactivas y el funcionamiento familiar con la participación en peleas o riñas, el descontrol emotivo y la rebeldía.



POBLACIÓN DE ESTUDIO

- Fuente de información secundaria -proyecto de investigación GISM - Línea psicosocial del grupo de investigación FNSP
- Originó BD “Riesgo de suicidio en adolescentes escolarizados de la zona nororiental de Medellín, año 2006”.
- Formulario C600 con el cual los colegios reportan su información estadística al DANE en el año 2006, se estimó el tamaño de la población de referencia del estudio y fue de 44.803 estudiantes de básica secundaria y media vocacional distribuidos en jornadas académicas, aproximadamente de 25.633 en la mañana y 19.140 en la tarde.

MUESTRA



- Para el estudio se tuvo una muestra de un tamaño de 779 adolescentes escolarizados en los colegios públicos y privados de la zona nororiental de Medellín durante el año 2006.



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

- Se construyó una encuesta con cinco instrumentos validados para el proyecto de investigación “Riesgo de suicidio en adolescentes escolarizados en la zona nororiental de Medellín, 2006”y fueron empleados para medir ciertas variables correspondientes.
- El Instrumento ISO=30 evaluaba la variable de riesgo de suicidio; la variable depresión fue evaluada por el instrumento CDI=LA; estructura y dinámica familiar por ¿Cómo es tu familia?, funcionamiento familiar por APGAR Familiar y el instrumento CIDI=II, la variable Consumo de sustancias psicoactivas.





VARIABLES

DESENLACE

Casos:

- Adolescentes con nivel alto de sintomatología de depresión.
- Adolescentes con nivel severo de disfunción familiar.
- Adolescentes que consumen alguna sustancias psicoactiva.

Controles:


- Adolescentes con nivel ninguno o leve de sintomatología de depresión.
- Adolescentes con buen funcionamiento familiar, leve o moderado.
- Adolescentes no que consumen alguna sustancias psicoactiva.



EXPOSICIÓN PRINCIPAL


- *Rebeldía*: adolescentes de la muestra total que notificaron tener actos de rebeldía.





RESULTADOS

ESTUDIANTES DE LA ZONA NORORIENTAL DE MEDELLÍN, 2006.



779



52%



48%




11 - 14

55,5%



DEPRESIÓN, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

| | | Categorías | Frecuencia | % | IC 95% |
|------------------------------------|----|------------|------------|-------|-------------|
| Depresión | | Alta | 83 | 10,7% | 8,5 - 12,9 |
| | | Leve | 134 | 17,2 | 14,5 - 19,9 |
| | | Ninguna | 562 | 72,1 | 69,0 - 75,2 |
| Nivel funcionamiento familiar | | Buena | 216 | 27,7 | 24,6 - 30,8 |
| | | Disfleve | 227 | 29,1 | 25,9 - 32,3 |
| | | Disfmode | 170 | 21,8 | 18,9 - 24,7 |
| | | Disfseve | 166 | 21,3% | 18,4 - 24,2 |
| Consumo de sustancias psicoactivas | | Sí | 319 | 63,8% | 59,6 - 68,0 |
| | | No | 181 | 36,2 | 32,0 - 40,4 |
| Rebeldía | Sí | | 207 | 27,1% | 22,2 - 32,0 |
| | No | | 556 | 72,9 | 68,0 - 77,8 |



SINTOMATOLOGÍA ALTA DE DEPRESIÓN



10,7%



59,0%

(48,4-69,6)



Media 14.31
Moda 13




11 - 14

60,2%

(49,7-70,7)



SINTOMATOLOGÍA ALTA DE DEPRESIÓN



DISFUNCIÓN FAMILIAR SEVERA



21,3%



51,8%

(44,2-59,4)



Media 14.79
Moda 16




15 - 19

54,8%


(47,2-62,4)



DISFUNCIÓN FAMILIAR SEVERA



CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS



CASOS Y CONTROLES

| | Depresión, Disfunción familiar severa, consumo de sustancias | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| | Casos | | | Controles | | |
| | n | Si % | IC 95% | n | Si % | IC 95% |
| Rebeldía - depresión | 36** | 44,3 | 33,5 - 55,1 | 171** | 25,1 | 21,8 - 28,4 |
| Rebeldía- disfseve | 58** | 35,6 | 28,2 - 43,0 | 149** | 24,4 | 21,0 - 27,8 |
| Rebeldía - consumo | 98** | 30,7 | 25,6 - 35,8 | 41** | 23,2 | 17,0 - 29,4 |



ASOCIACIONES

| | Depresión, Disfunción familiar severa, consumo de sustancias | | |
|-------------------------|---|---------------|----------|
| | OR | IC 95% | P |
| Rebeldía - depresión | 2,4 | 1,5-3,9 | 0,00 |
| Rebeldía- disfseve | 1,7 | 1,1-2,5 | 0,00 |
| Rebeldía - consumo | 1,5 | 1,1-2,4 | 0,06 |



CONCLUSIONES

- Los actos de rebeldía - factor importante en la salud mental de los adolescentes.
- Más frecuente - nivel alto en sintomatología de depresión en contraste con una menor frecuencia en el grupo control.
- Más frecuente - que consideran a su familia disfuncional .
- Más frecuente en los adolescentes escolarizados que consumen alguna sustancia psicoactiva.

