

Enfermería UdeA **Te cuida**

¿Cuándo debo acudir a los servicios de urgencias pediátricas?.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Enfermería

- Tiene dificultad para hablar, comer o caminar.
- Se desmayó, no reacciona a su llamado o estímulo o tiene la mirada fija.
- Está desorientado o hablando incoherencias.





➤ Presenta:
Palidez, mareo,
frialdad,
sudoración.

➤ Presenta:
Vómito
abundante y
repetidamente.





- Tiene diarrea aguda (cuando dura menos de 14 días-y se dan más de 10 defecaciones en un día). Diarrea persistente (cuando dura más de 14 días).
- Presencia de deshidratación: ojos hundidos, piel seca, sediento y bebe con ansias o avidez.

Presenta convulsiones





➤ Presenta erupción cutánea, ronchas que empeoran con el paso del tiempo. Refiere picazón o prurito que no mejora.

- Enrojecimiento de alguna zona de la piel, ardor, inflamación, dolor, presencia de pus, fiebre, malestar general y decaimiento.
- Si hay defensa al palpar una zona del cuerpo, que no mejora con la administración del analgesico ordenado por el medico.



Enfermería UdeA Te cuida

¿Cuándo debo acudir a los servicios de urgencias pediátricas?.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Enfermería



➤ En el caso de medir los niveles de glucosa en sangre, el resultado es menor a 60mg/dl. O cuando el resultado de glucosa en sangre es mayor a 126mg/dl en ayunas, o si después de haber comido, el resultado de glucosa es mayor a 200 mg/dl.

➤ Sospecha u observa objetos extraños en ojo, oído, nariz, recto y tubo digestivo. Si percibe un olor desagradable en nariz u oído de manera persistente que no mejora con la limpieza habitual o salida de pus.



➤ Dolor intenso, llanto inconsolable, malestar general, decaimiento o irritabilidad.

➤ Si el niño señala la parte del cuerpo que le duele y no se calma fácilmente.

➤ En presencia de deformidad o inflamación de un lugar del cuerpo.

➤ Si hay defensa al contacto y no hay mejoría con la administración de la dosis de analgésico recomendado por el médico tratante.



- Si evidencia dificultad para respirar, episodios de tos recurrentes que empeoran con el tiempo y aumento de moco.
- Ruidos en el pecho al respirar, movimientos rápidos y profundos durante la respiración, aleteo nasal (abre y cierra las fosas nasales)



➤ Olor o restos de sustancia tóxica en manos, boca y nariz. Sospecha de consumo de medicamentos, frascos destapados o derrames que puedan indicar que el niño los haya consumido.



➤ Presencia de heridas ocasionadas por golpes o cualquier tipo de trauma, quemaduras, material corto punzante con sangrado que no se detiene; si se presentan caídas, golpes o traumas que afecten la condición general de salud del niño.





⇒ En caso de salida de sangre por cualquier orificio corporal que no mejore con la presión o el hielo.