



# Manejo integral del tercer y cuarto períodos del parto, para mejorar la salud materna, neonatal e infantil

DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA  
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

ANTIOQUIA NUEVA, un hogar para la vida

Aplicarlo a todas las mujeres y recién nacidos en cada parto por personal calificado

1



Apenas nazca el (la) bebé, séquelo y evalúe su condición. Si está vigoroso colóquelo sobre el abdomen materno y cúbralo con un paño seco.

2



Inmediatamente verifique que no haya un segundo bebé y aplique 10 unidades de oxitocina vía intramuscular.

3



Pasados 3 minutos del nacimiento o cuando el cordón haya dejado de pulsar, píncelo y córtelo. Coloque el (la) bebé directamente sobre el pecho de la madre, piel a piel.

4




Verifique la contracción uterina y extraiga la placenta mediante tracción controlada del cordón umbilical. Presione simultáneamente sobre el útero en sentido contrario (contratracción).

5

Luego de la expulsión de la placenta realice un masaje vigoroso al útero en sentido trasversal por encima del abdomen inferior.

6



Durante las dos primeras horas del posparto, cada 15 minutos, palpe el útero sobre el abdomen y asegúrese de que no esté blando y que el sangrado sea normal. Verifique que el (la) bebé esté bien. Inicie la lactancia materna tan pronto como sea posible.



Felicitaciones, ¡Usted ha salvado dos vidas!

ANTIOQUIA NUEVA, un hogar para la vida